



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO

EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2015-16
GABARITO DAS QUESTÕES DE SAÚDE

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

Na Hepatite B, qual o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV, e que na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis rapidamente.

- A) HBsAg B) Anti-HBcIgM C) Anti-HBcIgG D) HBeAg E) Anti-HBs

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A alternativa A é a única dentre as presentes na questão que responde a pergunta.

Alternativa: (A)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

Nas demais alternativas, as opções são marcadores de outros estágios da Hepatite B.

BIBLIOGRAFIA:

BRASIL. Ministério da Saúde. **HIV/AIDS, hepatites e outras DST.** Disponível em:
<<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abca18.pdf>>. Acesso em: 07 jan. 2014

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe **especialmente:**

- A) Participar da programação da assistência de enfermagem.
B) Executar ações de tratamento simples.
C) Prestar cuidados de higiene e conforto do paciente.
D) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.
E) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A única afirmativa que indica a atividade exercida pelo Técnico de Enfermagem é a letra “A”. Nas alternativas “B” e “C” são atividades exercidas pelo Auxiliar de Enfermagem e alternativas “D” e “E” são atividades exercidas pelo Enfermeiro

Alternativa: (A)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

Nas alternativas “B” e “C” são atividades exercidas pelo Auxiliar de Enfermagem e alternativas “D” e “E” são atividades exercidas pelo Enfermeiro.

BIBLIOGRAFIA:

BRASIL. Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 26 jun. 1986

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

Qual a área de localização correta para administração de heparina?

- A) Abdome superior.
- B) Área adiposa anterior a ambas as cristas ilíacas.
- C) Área com a camada subcutânea mais fina.
- D) Área bem próxima ao umbigo.
- E) Área do músculo deltoide.

ANULADA

BIBLIOGRAFIA:

NETTINA, Sandra M. Brunner. Prática de enfermagem. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

O Plano de Atenção à Saúde da Mulher (PAISM) visa compreender os agravos à saúde da mulher e a construção de ações de prevenção de agravos e promoção de saúde efetivas. Como pontos fundamentais do PAISM, podem ser destacadas as alternativas abaixo, **exceto**:

- A) Atenção à violência contra a mulher.
- B) Ações de Saúde Mental.
- C) Atenção à saúde sexual e reprodutiva.
- D) Apoio social e econômico.**
- E) Atenção qualificada às mulheres com queixas ginecológicas.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A alternativa (D) é a única dentre as presentes na questão que não responde aos pontos fundamentais que o PAISM destaca.

Alternativa: (D)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

As alternativas A, B, C e E apresentam os pontos fundamentais que o PAISM aborda no item 8 – Atenção Integral da Mulher no NASF.

BIBLIOGRAFIA:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família.** Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcd27.pdf> Acesso em: 07 jan. 2014

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

A direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, **exceto:**

- A) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico
- B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS)
- C) Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho
- D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros**
- E) Participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A opção que responde a opção correta é a letra D, pois é a única alternativa que faz parte da direção municipal do SUS.

Alternativa: (D)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

As alternativas A, B, C e E fazem parte da direção estadual do SUS, portanto tornam-se erradas já que a pergunta pede a exceção.

BIBLIOGRAFIA:

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2014.

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

Arteriosclerose é uma doença arterial manifestada pela perda da elasticidade e endurecimento da parede vascular. Qual é o tipo mais comum de Arteriosclerose?

- A) Doença Arterial Aguda
- B) Aneurisma
- C) Doença de Buerger
- D) Doença Arterial Periférica Oclusiva
- E) Aterosclerose**

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A única alternativa que apresenta o tipo mais comum da Arteriosclerose é a E.

Alternativa: (E)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

As alternativas A, B, C e D são outros distúrbios da artéria, mas não da arteriosclerose.

BIBLIOGRAFIA:

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. **Tratado de enfermagem médico-cirúrgica**. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

A definição “É o deslocamento para baixo (protusão) da bexiga para o centro da vagina”, caracteriza qual termo

técnico?

- A) Bexigoma B) Uretrocele C) Enterocele D) Retocele **E) Cistocele**

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A única alternativa que apresenta definição correta é a E.

Alternativa: (E)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

As alternativas A, B, C e D são outros distúrbios dos músculos pélvicos.

BIBLIOGRAFIA:

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

São doenças de etiologia infecciosa aguda e crônica, respectivamente:

- A) Cirrose devida ao álcool e tuberculose; B) Tétano e diabetes; **C) Raiva e tuberculose;**
D) Envenenamento por picada de cobra e diabetes; E) Hanseníase e doença coronariana

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

A classificação dá-se quanto à duração e etiologia; Agudas são aquelas de curta duração, e as crônicas são aquelas que se desenvolvem a longo prazo. As de origem infecciosa são aquelas que resultam de infecção, ou seja, na penetração, desenvolvimento e multiplicação do patógeno no meio interno do hospedeiro. Logo, a assertiva que, respectivamente, responde à questão é a letra c) Raiva e tuberculose, por conter exemplo de infecção aguda e crônica

Alternativa: (C)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

- A) Cirrose devida ao álcool é doença crônica não-infecciosa;
B) Diabetes é doença crônica, mas de origem não-infecciosa;
D) Envenenamento por picada de cobra é doença aguda, mas de origem não-infecciosa;
E) Hanseníase é doença de origem infecciosa, porém crônica e, não aguda. Doença coronariana é crônica e de origem não-infecciosa.

BIBLIOGRAFIA:

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

São tipos de vias de administração indicadas na terapia nutricional de longo prazo, além de reduzirem risco de aspiração:

- A) Parenteral e enteral;
B) Enteral e jejunostomias;

C) Gastrostomia ou jejunostomia;

D) Oral e parenteral ;

E) Gastrectomia e jejunostomia.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

São aberturas por técnica cirúrgica ou endoscópica da cavidade anatômica para administração da nutrição através de sonda, indicadas na terapia nutricional de longo prazo, e tem vantagem de reduzirem risco de aspiração.

Alternativa: (C)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

A) Nutrição Parental (NP) não é utilizada a longo prazo;

B) A Nutrição Enteral (NE) por períodos prolongados, realizada através de sonda nasoenteral, pode levar a complicações como aspiração pulmonar das soluções infundidas;

D) A dieta por via oral apresenta riscos de aspiração pulmonar e a Nutrição Parental (NP) não é utilizada a longo prazo;

E) Gastrectomia é a retirada de porção do estômago, não tendo relação com o enunciado da questão.

BIBLIOGRAFIA:

MOZACHI, Nelson. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 1ª Ed. Curitiba: Os Autores, 2005.

APROVEITADA PARA: () Combatente/Logística/Técnico/Aviação () MÚSICA (X) SAÚDE

QUESTÃO:

São sinais clássicos do choque hipovolêmico:

A) Rubor, calor, respiração lenta e ofegante, urina abundante e relaxamento do esfíncter uretral;

B) Pele fria, respiração rápida, cianose nos lábios e língua, pulso rápido, fraco e filiforme;

C). Urina concentrada, hipertensão arterial, cianose gengival e labial;

D). Palidez mucocutânea, pulso lento, poliúria, normotensão;

E). Pressão de pulso divergente, lábios normocorados, pele quente, agitação psicomotora

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

O choque hipovolêmico é causado pela acentuada diminuição da volemia intravascular (Hemorragia), seus efeitos são os sintomas descritos na assertiva b).

Alternativa: (B)

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO:

A) Rubor, calor, respiração lenta e ofegante, urina abundante e relaxamento do esfíncter uretral: há aporte do sangue da periferia para irrigação dos órgãos nobres: cérebro, coração e rins. Por isso, NÃO SE VERIFICA rubor, calor nem urina abundante;

C) Urina concentrada, hipertensão arterial, cianose gengival e labial: Como há diminuição da volemia, observa-se queda da pressão arterial e NÃO hipertensão arterial;

D) Palidez mucocutânea, pulso lento, poliúria, normotensão: Não se observa poliúria (aumento do volume urinário) nem normotensão, que é a pressão arterial dentro dos padrões normais, mas, alteração desses padrões devido queda da volemia intravascular;

E) Pressão de pulso divergente, lábios normocorados, pele quente, agitação psicomotora: não se observa lábios normocorados devido aporte de sangue para o centro do corpo e não para a periferia, a pele apresenta-se fria e pegajosa e não quente

BIBLIOGRAFIA:

BRUNNER, I.S., SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11ª ed. Guanabara Koogan,

